

DBA/2 Cr Slc マウス

血液学的性状 平均値±標準偏差 (N: 検査匹数)

項目 / 単位	雄		雌	
	10週齢 (N: 9)		10週齢 (N: 9)	
RBC $\times 10^4 / \text{mm}^3$	1104	± 31.9	1059	± 44.3
Ht %	48.9	± 1.50	47.2	± 2.53
Hb g/dl	15.0	± 0.39	14.6	± 0.61
WBC $\times 10^2 / \text{mm}^3$	23	± 6.6	22	± 6.1
BP $\times 10^4 / \text{mm}^3$	105.2	± 6.79	99.0	± 12.35
MCV fl	44.2	± 0.24	44.5	± 0.65
MCH pg	13.6	± 0.13	13.8	± 0.49
MCHC g/dl	30.7	± 0.39	31.0	± 1.33
白血球百分比(N=5)				
リンパ球 %	77.6	± 3.45	73.6	± 6.53
単球 %	3.4	± 1.75	5.4	± 1.98
好塩基球 %	0.0	± 0.00	0.0	± 0.00
好酸球 %	1.6	± 0.89	3.4	± 2.53
好中球				
桿状核好中球 %	12.4	± 2.53	12.5	± 4.86
分葉核好中球 %	5.0	± 1.62	5.1	± 2.07

採血日の前日から約16時間絶食。

固型飼料: Autoclavable Mouse Diet 5021 (米国PMIマウス社)

血液学的性状: エーテル麻酔下で腹大動脈より採血した血液 (アングロット/ET; 日本商事 添加) をCoulter Counter T-660で測定。

RBC: 赤血球数

BP: 血小板数

Ht: ヘマトクリット値

MCV: 平均赤血球容積

Hb: ヘモグロビン量

MCH: 平均赤血球色素量

WBC: 白血球数

MCHC: 平均赤血球色素濃度

血液化学的性状 平均値±標準偏差 (N: 検査例数)

項目 / 単位	雄		雌	
	10週齢 (N: 9)		10週齢 (N: 9)	
TP g/dl	5.1	± 0.21	5.0	± 0.18
ALB g/dl	1.8	± 0.07	1.8	± 0.07
A/G	0.55	± 0.029	0.57	± 0.015
AST(GOT) I.U. / l	68	± 37.2	121	± 59.3
ALT(GPT) I.U. / l	25	± 15.1	51	± 28.7
ALP I.U. / l	349	± 24.0	413	± 26.1
GLU mg/dl	67	± 18.6	78	± 24.8
T.CHO mg/dl	112	± 3.6	71	± 3.9
TG mg/dl	115	± 18.0	102	± 14.2
PL mg/dl	221	± 5.8	144	± 8.1
T.BIL mg/dl	0.42	± 0.087	0.47	± 0.140
BUN mg/dl	29.5	± 5.62	23.2	± 1.16
CRE mg/dl	0.4	± 0.07	0.4	± 0.05
IP mg/dl	8.5	± 0.77	8.4	± 0.53
Ca mEq / l	5.03	± 0.117	5.04	± 0.110
Na mEq / l	148.0	± 0.99	144.9	± 1.33
K mEq / l	5.79	± 0.763	5.97	± 0.829
Cl mEq / l	123.0	± 1.63	120.4	± 0.93

採血日の前日から約16時間絶食。

固型飼料: Autoclavable Mouse Diet 5021 (米国PMIマウス社)

エーテル麻酔下で腹大動脈より採血、2~3匹をプールし、分離した血清は-80で保存した後、日立-736/10型オートアナライザーで測定。

Na、KはFLAME PHOTOMETER FLAME-30Cで、ClはCHLOR METER C-200APで測定。

(測定方法) TP: 総蛋白質量

: Biuret法

T.BIL: 総ビリルビン量: Diazo法

ALB: アルブミン量

: BCG法

BUN: 尿素窒素量: Urease-GLDH法

A/G: アルブミン/グロブリン比

: ALB/(TP-ALB)

CRE: クレアチニン量: Jaffe法

AST: アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ活性: NADH UV-rate assay法

IP: 無機リン: Fiske-Subbarow法

ALT: アラニンアミノトランスフェラーゼ活性: NADH UV-rate assay法

Ca: カルシウム: OCPC法

ALP: アルカリ性ホスファターゼ活性: p-NPP法

Na: ナトリウム: 炎光光度法

GLU: グルコース量: GLK-G6PDH法

K: カリウム: 炎光光度法

T.CHO: 総コレステロール量: CE-CO-POD法


Cl: クロライド: 電量滴定法

TG: トリグリセライド量: LPL-GK-GPO-POD法

PL: リン脂質量: PLD-COD-POD法

DBA/2 Cr Slc マウス

体重曲線



系統	性別	週齢	3w	4w	5w	6w	7w	8w	9w	10w
DBA/2 Cr		Mean	7.7	12.3	17.2	19.9	22.1	23.3	25.0	26.1
		S.D.	0.5	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.5
		Mean	7.6	11.4	15.9	17.1	18.2	19.5	20.2	20.8
		S.D.	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	0.9	0.8

臓器重量

平均値 ± 標準偏差 (N: 検査例数)

臓器名		雄	雌
		10週齢 (N:10)	10週齢 (N:10)
体重	g	25.6 ± 1.6	22.4 ± 1.0
(実重量)			
脳	g	0.399 ± 0.004	0.404 ± 0.009
心臓	g	0.130 ± 0.011	0.122 ± 0.003
肺臓	g	0.147 ± 0.010	0.133 ± 0.009
腎臓(左)	g	0.155 ± 0.014	0.116 ± 0.004
(右)	g	0.160 ± 0.016	0.121 ± 0.008
脾臓	g	0.066 ± 0.006	0.078 ± 0.006
肝臓	g	0.906 ± 0.089	0.842 ± 0.064
精巣(左)	g	0.096 ± 0.010	
(右)	g	0.098 ± 0.009	
卵巣(左)	mg		8.0 ± 1.5
(右)	mg		7.9 ± 1.4
胸腺	g	0.040 ± 0.007	0.046 ± 0.006
(100g体重比)			
脳	mg%	1565.61 ± 105.21	1802.03 ± 85.14
心臓	mg%	510.85 ± 43.09	544.21 ± 31.87
肺臓	mg%	577.80 ± 46.99	596.32 ± 54.54
腎臓(左)	mg%	606.56 ± 37.56	519.43 ± 35.76
(右)	mg%	624.81 ± 40.19	542.21 ± 48.11
脾臓	mg%	260.12 ± 14.26	346.98 ± 28.31
肝臓	mg%	3542.64 ± 211.37	3757.66 ± 277.35
精巣(左)	mg%	378.08 ± 40.87	
(右)	mg%	383.85 ± 37.58	
卵巣(左)	mg%		35.78 ± 7.02
(右)	mg%		35.41 ± 7.12
胸腺	mg%	158.41 ± 26.95	205.57 ± 27.42